



4回目接種 絶対ダメ



厚生労働省

2022年4月
集計方法
変更で

打てば打つほど感染する!?

厚労省はワクチン接種回数別の感染者数の集計において、接種に関して未記入があった場合「未接種」に計上。修正された公表データによると未接種者より2回接種済みの方がPCR陽性率が高い事が判明。これまでの統計はワクチンの効果が水増しされていた可能性があります。

海外からも
同様の報告



イギリス保健安全保障庁
未接種者より3回目接種者の方が
2~4倍の感染(PCR陽性)リスク



感染(PCR陽性)だけではなく

カナダ政府

死亡リスクも上昇



打てば打つほど

アメリカ疾病対策予防センター

免疫低下

带状疱疹の発症
免疫不全症候群による癌の報告 **急増**

(他の病気になりやすくなります)

国内でも3回接種済みで
コロナ陽性になる人が急増しています

感染も重症化も防げないワクチン

絶対にやめましょう



新型コロナワクチン 接種後

死亡報告 **1,743** 人 重篤報告 **22,442** 人

重篤報告の中には今も回復ができず、日常生活をおくることさえも困難な人が多数います

そもそも新型コロナワクチンに使用されている遺伝子ワクチンは
中長期的な安全が確立されたものではありません



WHO (世界保健機関) 有害事象報告件数

1位	新型コロナワクチン	2,457,386 件	(2020-2021)	過去 1 年分
2位	インフルエンザワクチン	272,202 件	(1968-2021)	過去 53 年分
3位	肺炎球菌ワクチン	234,781 件	(1980-2021)	過去 41 年分
4位	アスピリン	184,481 件	(1968-2021)	過去 53 年分
5位	タイレノール	169,159 件	(1968-2021)	過去 53 年分

ワクチン接種後 免疫不全による原因不明の体調不良が多発

ワクチン後遺症の可能性ががあります

主な症状

症状は多岐に渡ります

長引く頭痛 皮膚疾患 聴力異常 視力低下
ひどい倦怠感 胸痛 不正出血 心筋炎 脱毛
歩行困難 記憶力低下 帯状疱疹 関節痛

原因が不明で気持ちの問題として扱われてしまい、不要なはずの精神科の薬が処方され、問題が複雑化する可能性があります



— 自分でもできる対策 —

FLCCC※ワクチン接種後の治療 より

※新型コロナの治療手順等を作成している海外の医師団体
(<https://covid19criticalcare.com/ja/>)

間欠的ファスティング(断食) 1日の一定時間の中で食事を摂る

12 時間断食(12 時間以内に食べる) / 16 時間断食(8 時間以内に食べる) / 20 時間断食(4 時間以内に食べる)

食事をとらない時間を作ることで、体内の不要なもの、有害なものを取り除き、新しい細胞に生まれ変わらせる仕組みが活性化されます。不良品のたんぱく質や古くなったミトコンドリアが除去されることで免疫を高めたり様々な疾患の発症を抑えることにつながります。ワクチン接種によって生産されるスパイクタンパク質の分解と除去も促進される可能性があります

サプリメント(1日に摂取する目安量)

ビタミン C	1000mg を 3~4 回
ビタミン D	4000~5000 IU
ビタミン K	100µg

※薬の服用・疾患のある方は医師または専門機関にご相談ください



専門機関に相談したい場合は各都道府県に相談窓口が設置されています

全国有志医師の会でも新型コロナワクチン後遺症の相談にのれる病院があります



《北海道有志医師の会》

代表発起人 藤沢 明德 賛同して頂ける医師、歯科医、獣医の方を随時募集！ お問い合わせはメールにてお願いします！ fujisawa.peace@mac.com

一林 正剛	梅田 弘胤	大池三千男	太田 貴之	岡澤林太郎	沖田 一希	賀陽 真哉
川崎 和凡	工藤安紀子	末武 敬司	関根 徹	高橋 浩司	田中 智	田谷 智
鄭 鍾美	津野 理園	中川 雅文	波岡 英治	仁平 洋	橋本 英樹	原田 雅仁
藤岡 洋介	藤原 明洋	牧野 孝一	松岡 健	山川 智士	柳田 尚之	山田 幸恵
吉野 光晴					(50音順)	他、賛同人14名